

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Embryologie de l'appareil génital

Embryologie de l'appareil génital

- I- INTRODUCTION
- II- EBAUCHE GONADIQUE
- III- GONADE INDIFFERENCIÉE
- IV- DIFFERENCIATION TESTICULAIRE

INTRODUCTION

L' appareil de reproduction constitue l'ensemble des organes participant à la fonction de reproduction quel que soit le sexe. Il atteint sa maturité fonctionnelle seulement à la puberté. Il comprend chez l'homme :

- les gonades
- les voies génitales ou gonoductes
- les glandes annexées aux voies genitales
- les organes génitaux externes

I- Ebauche gonadique


Sur une coupe transversale de la région lombaire d'un embryon humain de 4 semaines ,
L' ébauche gonadique apparait à la face postérieure

De la cavité coelomique,

Entre le mesonephros , et la racine du mésentère

Sous forme d'un épaissement
de l' épithélium coelomique ,
connu sous le nom de crête ou
éminence génitale.

Fig1: coupe transversale de la
Région dorsale d'un embryon
humain de 4 semaines



- 2 dérivés mésoblastiques contribuent au développement de la gonade ;

Ce sont :


1- l' épithélium coelomique

2- le mésenchyme

Quant aux gonocytes primordiaux, leur apparition se fait très tôt (3eme semaine)

Dans l' aire extra – embryonnaire ; au sein ou au contact du diverticule allantoïdien.

De là , ces cellules migrent le long du mésentère dorsal en direction des crêtes génitales.




2 – gonade indifférenciée

- Au cours de la 6eme semaine du D.E , l' ébauche gonadique est le siège de 2 transformations évolutives;
 - 1- les gonocytes envahissent la crête génitale
 - 2- l' épithélium coelomique de la crête génitale prolifère dans le mésenchyme , donnant naissance a des cordons pleins ou cordons sexuels.
- Ces derniers continuent à proliférer en profondeur et finissent par s' anastomoser en un réseau complexe appelé **RETE** .

- **Fig. 2:** gonade indifférenciée
(Coupe transversale de la région lombaire d' un embryon de 6 semaines)

- 1= épithélium coelomique
- 2= cordon sexuel
- 3= RETE
- 4= canal de MULLER



- Jusqu' à la fin de la 6eme semaine , la gonade revêt le même aspect morphologique dans les deux sexe ; elle est indifférenciée.

(le sexe génétique est déjà connu.)


- **Fig. 2:** gonade indifférenciée
(Coupe transversale de la région lombaire d' un embryon de 6 semaines)

1= épithélium cœlomique

2= cordon sexuel

3= RETE

4= canal de MULLER



3- différenciation testiculaire

Des la 7eme semaine du D.E

La gonade Jusque là
indifférenciée , évolue
en testicule .

Cette différenciation

Est conditionnée par le sexe
génétique XY .

Elle est sous la dépendance de
gènes portés sur le bras court du
chromosome (gonosome) Y .

Fig. 3 : différenciation testiculaire

A= testicule et voies génitales males


1 = cordon testiculaire

2 = RETE TESTIS 3= cônes efférent

4= tubes mesonephrotiques

5= canal de WOLFF

6 = albuginée



• Sur le plan morphologique ,
L' évolution testiculaire de la
gonade indifférenciée se
caractérise par:

1- la migration des gonocytes dans les cordons sexuels .

Ces derniers devenus cordons
testiculaires comportent 2 types
de cellules:

- les gonocytes ou grandes
cellules germinatives à l'
origine des spermatogonies
- les petites cellules
végétatives , d' origine
coelomique qui se
transforment en cellules de
SERTOLI .




Fig. 3 : différenciation testiculaire

a= testicule et voies génitales males 1 = **cordon testiculaire**

b= cordon testiculaire (coupe transversale)

**1- gonocytes ou grandes cellules
germinatives**

2= petites cellules végétatives

- 2- la fusion du rete , devenu **rete testis** , avec la partie adjacente des Tubes mesonephrotiques situés dans la partie moyenne du corps de WOLFF, Ces tubes , qui , a leur extrémité distale se jettent dans le canal de Wolff (futur épидидyme), deviennent les cônes efférents (voies spermatiques)

Ainsi s'établissent les premières connexions uro – génitales.

- 3- la différenciation dans le mésenchyme séparant les cordons testiculaires , des cellules interstitielle ou cellules de LEYDIG.

- 4- l' interposition d' une lame conjonctive périphérique (d' origine mésenchymateuse) :

L'albuginée entre l' épithélium coelomique et le reste de la glande génitale




Fig. 3 : différenciation testiculaire

A= testicule et voies génitales males

1 = cordon testiculaire

2 = RETE TESTIS 3= cônes efférent

4= tubes mesonephrotiques

5= canal de WOLFF


6 = albuginée

8 = mésenchyme et cellules de LEYDIG

4- différenciation ovarienne

- Des la 8eme semaine du D.E,
La gonade jusque là
indifférenciée , évolue en
ovaire.

Cette différenciation est
conditionnée par le sexe
Génétique XX; elle est sous la
dépendance des gènes étagés le
Long d' un des chromosomes X.




- Sur le plan morphologique,
La différenciation ovarienne
marquée par :

1- une régression :

- des cordons sexuels primaires

Qui , refoulés vers la partie centrale de l' ovaire , constituent les cordons médullaires ;

- du rete ovarii et de ses connexions avec les tubes mesonephrotiques (après régression , l' ensemble de ces structures primitives formeront l' organe de ROSENMULLER ou épooophore) .



2- une 2eme poussée de l' épithélium
cœlomique à l'origine de cordons
sexuels secondaire, occupant le
cortex ovarien ; ce sont les cordons
corticaux ou cordon de VALENTIN
FFEUGER , des cellules formés de 2
types cellulaires:

- les gonocytes ou grandes cellules
germinatives qui sont a l' origine des
ovogonies.
- les petites cellules végétatives ,
d' origine cœlomique qui deviendront
les cellules folliculaires .

3- une interposition de mésenchyme
qui
sépare tardivement les cordons
corticaux de l' épithélium cœlomique ;
celui-ci deviendra alors l' épithélium de
revêtement de l' ovaire.

